

## **Captopril, Enalapril, Fosinopril,**

## **Lisinopril, Perindopril**



### **These medications interacts with:**

- All food
- Can cause high potassium level if taken with high potassium foods such as bananas, dates, tomatoes, potatoes and orange juice.

### **It is advisable if you are using this medication to:**

- Take it one hour before or two hours after food
- Limit intake of potassium rich foods such as bananas, dates, tomatoes, potatoes and orange juice intake.

*Prepared & Approved by:* Patient & Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

**References :**available upon request

07.01.2007

## **Captopril, Enalapril, Fosinopril,**

## **Lisinopril, Perindopril**



### **These medications interacts with:**

- All food
- Can cause high potassium level if taken with high potassium foods such as bananas, dates, tomatoes, potatoes and orange juice.

### **It is advisable if you are using this medication to:**

- Take it one hour before or two hours after food
- Limit intake of potassium rich foods such as bananas, dates, tomatoes, potatoes and orange juice intake.

*Prepared & Approved by:* Patient & Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

**References :**available upon request

07.01.2007

## **Captopril, Enalapril, Fosinopril,**

## **Lisinopril, Perindopril**



### **These medications interacts with:**

- All food
- Can cause high potassium level if taken with high potassium foods such as bananas, dates, tomatoes, potatoes and orange juice.

### **It is advisable if you are using this medication to:**

- Take it one hour before or two hours after food
- Limit intake of potassium rich foods such as bananas, dates, tomatoes, potatoes and orange juice intake.

*Prepared & Approved by:* Patient & Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

**References :**available upon request

07.01.2007

## **Captopril, Enalapril, Fosinopril,**

## **Lisinopril, Perindopril**



### **These medications interacts with:**

- All food
- Can cause high potassium level if taken with high potassium foods such as bananas, dates, tomatoes, potatoes and orange juice.

### **It is advisable if you are using this medication to:**

- Take it one hour before or two hours after food
- Limit intake of potassium rich foods such as bananas, dates, tomatoes, potatoes and orange juice intake.

*Prepared & Approved by:* Patient & Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

**References :**available upon request

07.01.2007



**إن هذا الدواء يتفاعل مع الأغذية التالية:**

- أي طعام
- الطعام الغني بالبوتاسيوم مثل: الموز، التمر، الطماطم، البطاطس، وعصير البرتقال

**لذا ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:**

- تناوله قبل ساعتين من تناول الطعام أو بعده بساعتين
- قلل من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل: الموز، التمر، الطماطم، البطاطس، وعصير البرتقال

المرجع متوفر عند الطلب



**إن هذا الدواء يتفاعل مع الأغذية التالية:**

- أي طعام
- الطعام الغني بالبوتاسيوم مثل: الموز، التمر، الطماطم، البطاطس، وعصير البرتقال

**لذا ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:**

- تناوله قبل ساعتين من تناول الطعام أو بعده بساعتين
- قلل من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل: الموز، التمر، الطماطم، البطاطس، وعصير البرتقال

المرجع متوفر عند الطلب



**إن هذا الدواء يتفاعل مع الأغذية التالية:**

- أي طعام
- الطعام الغني بالبوتاسيوم مثل: الموز، التمر، الطماطم، البطاطس، وعصير البرتقال

**لذا ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:**

- تناوله قبل ساعتين من تناول الطعام أو بعده بساعتين
- قلل من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل: الموز، التمر، الطماطم، البطاطس، وعصير البرتقال

المرجع متوفر عند الطلب



**إن هذا الدواء يتفاعل مع الأغذية التالية:**

- أي طعام
- الطعام الغني بالبوتاسيوم مثل: الموز، التمر، الطماطم، البطاطس، وعصير البرتقال

**لذا ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:**

- تناوله قبل ساعتين من تناول الطعام أو بعده بساعتين
- قلل من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل: الموز، التمر، الطماطم، البطاطس، وعصير البرتقال

المرجع متوفر عند الطلب