

ESTROGEN



This medication interacts with:

- All food
- Dairy products like milk, yoghurt and cheese
- Grapefruit juice

It is advisable if you are using this medication to:

- Take it after dinner to minimize side effects
- Not to take it with dairy products
- Not to take it with grapefruit juice.

Prepared& Approved by: Patient& Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

References :available upon request

07.01.2007

ESTROGEN



This medication interacts with:

- All food
- Dairy products like milk, yoghurt and cheese
- Grapefruit juice

It is advisable if you are using this medication to:

- Take it after dinner to minimize side effects
- Not to take it with dairy products
- Not to take it with grapefruit juice.

Prepared& Approved by: Patient& Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

References :available upon request

07.01.2007

ESTROGEN



This medication interacts with:

- Any food
- Dairy products like milk, yoghurt and cheese
- Grapefruit juice

It is advisable if you are using this medication to:

- Take it after dinner to minimize side effects
- Not to take it with dairy products
- Not to take it with grapefruit juice.

Prepared& Approved by: Patient& Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

References :available upon request

07.01.2007

ESTROGEN



This medication interacts with:

- Any food
- Dairy products like milk, yoghurt and cheese
- Grapefruit juice

It is advisable if you are using this medication to:

- Take it after dinner to minimize side effects
- Not to take it with dairy products
- Not to take it with grapefruit juice.

Prepared& Approved by: Patient& Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

References :available upon request

07.01.2007



الاستروجين

إن هذا الدواء يتداخل مع:

- كل الاطعمة.
- منتجات الألبان مثل الحليب، اللبن والأجبان.
- عصير الجريب فروت.

لذا ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:

- تناوله بعد الأكل.
- تجنب تناوله في نفس الوقت مع منتجات الألبان.
- تجنب تناوله في نفس الوقت مع عصير الجريب فروت.

المرجع متوفر عند الطلب



الاستروجين

إن هذا الدواء يتداخل مع:

- كل الاطعمة.
- منتجات الألبان مثل الحليب، اللبن والأجبان.
- عصير الجريب فروت.

لذا ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:

- تناوله بعد الأكل.
- تجنب تناوله في نفس الوقت مع منتجات الألبان.
- تجنب تناوله في نفس الوقت مع عصير الجريب فروت.

المرجع متوفر عند الطلب



الاستروجين

إن هذا الدواء يتداخل مع:

- كل الاطعمة.
- منتجات الألبان مثل الحليب، اللبن والأجبان.
- عصير الجريب فروت.

لذا ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:

- تناوله بعد الأكل.
- تجنب تناوله في نفس الوقت مع منتجات الألبان.
- تجنب تناوله في نفس الوقت مع عصير الجريب فروت.

المرجع متوفر عند الطلب



الاستروجين

إن هذا الدواء يتداخل مع:

- كل الاطعمة.
- منتجات الألبان مثل الحليب، اللبن والأجبان.
- عصير الجريب فروت.

لذا ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:

- تناوله بعد الأكل.
- تجنب تناوله في نفس الوقت مع منتجات الألبان.
- تجنب تناوله في نفس الوقت مع عصير الجريب فروت.

المرجع متوفر عند الطلب