

CIPROFLOXACIN



This medication interacts with:

- Iron, calcium, aluminum, zinc, magnesium.
- Dairy products like milk, yoghurt, cheese.
- Vitamins with Minerals.
- Caffeine.

It is advisable if you are using this medication to:

- Take it with food to minimize stomach upset.
- Avoid antacid or dairy products use within 2 hours before or 4 hours after dosing.
- Reduce excessive use of caffeinated beverages like coffee, tea & cola soft drinks.

Prepared & Approved by: Patient & Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

*References :*available upon request 18.04.2006

CIPROFLOXACIN



This medication interacts with:

- Iron, calcium, aluminum, zinc, magnesium.
- Dairy products like milk, yoghurt, cheese.
- Vitamins with Minerals.
- Caffeine.

It is advisable if you are using this medication to:

- Take it with food to minimize stomach upset.
- Avoid antacid or dairy products use within 2 hours before or 4 hours after dosing.
- Reduce excessive use of caffeinated beverages like coffee, tea & cola soft drinks.

Prepared & Approved by: Patient & Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

*References :*available upon request 18.04.2006

CIPROFLOXACIN



This medication interacts with:

- Iron, calcium, aluminum, zinc, magnesium.
- Dairy products like milk, yoghurt, cheese.
- Vitamins with Minerals.
- Caffeine.

It is advisable if you are using this medication to:

- Take it with food to minimize stomach upset.
- Avoid antacid or dairy products use within 2 hours before or 4 hours after dosing.
- Reduce excessive use of caffeinated beverages like coffee, tea & cola soft drinks.

Prepared & Approved by: Patient & Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

*References :*available upon request 18.04.2006

CIPROFLOXACIN



This medication interacts with:

- Iron, calcium, aluminum, zinc, magnesium.
- Dairy products like milk, yoghurt, cheese.
- Vitamins with Minerals.
- Caffeine.

It is advisable if you are using this medication to:

- Take it with food to minimize stomach upset.
- Avoid antacid or dairy products use within 2 hours before or 4 hours after dosing.
- Reduce excessive use of caffeinated beverages like coffee, tea & cola soft drinks.

Prepared & Approved by: Patient & Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

*References :*available upon request 18.04.2006



إن هذا الدواء يتداخل مع الأغذية التالية:

- الحديد، الكالسيوم، الألمينيوم، الخارصين والمغنيسيوم.
- منتجات الألبان مثل الحليب، اللبن والأجبان.
- الفيتامينات والمعادن.
- الكافئين.

لذا ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:

- تناوله مع الأكل للتقليل من اضطرابات المعدة.
- تجنب تناول مضادات الحموضة أو منتجات الألبان قبل ساعتين أو بعد أربع ساعات من تناول هذا الدواء.
- التقليل من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي، القهوة والمشروبات الغازية.

المرجع متوفر عند الطلب.



إن هذا الدواء يتداخل مع الأغذية التالية:

- الحديد، الكالسيوم، الألمينيوم، الخارصين والمغنيسيوم.
- منتجات الألبان مثل الحليب، اللبن والأجبان.
- الفيتامينات والمعادن.
- الكافئين.

لذا ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:

- تناوله مع الأكل للتقليل من اضطرابات المعدة.
- تجنب تناول مضادات الحموضة أو منتجات الألبان قبل ساعتين أو بعد أربع ساعات من تناول هذا الدواء.
- التقليل من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي، القهوة والمشروبات الغازية.

المرجع متوفر عند الطلب.



إن هذا الدواء يتداخل مع الأغذية التالية:

- الحديد، الكالسيوم، الألمينيوم، الخارصين والمغنيسيوم.
- منتجات الألبان مثل الحليب، اللبن والأجبان.
- الفيتامينات والمعادن.
- الكافئين.

لذا ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:

- تناوله مع الأكل للتقليل من اضطرابات المعدة.
- تجنب تناول مضادات الحموضة أو منتجات الألبان قبل ساعتين أو بعد أربع ساعات من تناول هذا الدواء.
- التقليل من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي، القهوة والمشروبات الغازية.

المرجع متوفر عند الطلب.



إن هذا الدواء يتداخل مع الأغذية التالية:

- الحديد، الكالسيوم، الألمينيوم، الخارصين والمغنيسيوم.
- منتجات الألبان مثل الحليب، اللبن والأجبان.
- الفيتامينات والمعادن.
- الكافئين.

لذا ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:

- تناوله مع الأكل للتقليل من اضطرابات المعدة.
- تجنب تناول مضادات الحموضة أو منتجات الألبان قبل ساعتين أو بعد أربع ساعات من تناول هذا الدواء.
- التقليل من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي، القهوة والمشروبات الغازية.

المرجع متوفر عند الطلب.