

SPIRONOLACTONE



These medications interacts with:

- All food
- Can cause high potassium level if taken with high potassium foods such as bananas, dates, tomatoes, potatoes and orange juice.

It is advisable if you are using this medication to:

- Take it one hour before or two hours after food
- Limit intake of potassium rich foods such as bananas, dates, tomatoes, potatoes and orange juice intake.

Prepared & Approved by: Patient & Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

References :available upon request

07.01.2007

SPIRONOLACTONE



These medications interacts with:

- All food
- Can cause high potassium level if taken with high potassium foods such as bananas, dates, tomatoes, potatoes and orange juice.

It is advisable if you are using this medication to:

- Take it one hour before or two hours after food
- Limit intake of potassium rich foods such as bananas, dates, tomatoes, potatoes and orange juice intake.

Prepared & Approved by: Patient & Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

References :available upon request

07.01.2007

SPIRONOLACTONE



These medications interacts with:

- All food
- Can cause high potassium level if taken with high potassium foods such as bananas, dates, tomatoes, potatoes and orange juice.

It is advisable if you are using this medication to:

- Take it one hour before or two hours after food
- Limit intake of potassium rich foods such as bananas, dates, tomatoes, potatoes and orange juice intake.

Prepared & Approved by: Patient & Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

References :available upon request

07.01.2007

SPIRONOLACTONE



These medications interacts with:

- All food
- Can cause high potassium level if taken with high potassium foods such as bananas, dates, tomatoes, potatoes and orange juice.

It is advisable if you are using this medication to:

- Take it one hour before or two hours after food
- Limit intake of potassium rich foods such as bananas, dates, tomatoes, potatoes and orange juice intake.

Prepared & Approved by: Patient & Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

References :available upon request

07.01.2007



إن هذا الدواء يتفاعل مع:

- كل الأطعمة

- يسبب ارتفاع في مستوى البوتاسيوم في الدم اذا تم تناوله مع الاطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل: الموز،التمر،الطماطم، البطاطس، وعصير البرتقال

لذا ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:

- تناوله قبل ساعتين من تناول الطعام أوبعده بساعتين
- قلل من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل: الموز،التمر،الطماطم، البطاطس، وعصير البرتقال

المرجع متوفر عند الطلب



إن هذا الدواء يتفاعل مع:

- كل الأطعمة

- يسبب ارتفاع في مستوى البوتاسيوم في الدم اذا تم تناوله مع الاطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل: الموز،التمر،الطماطم، البطاطس، وعصير البرتقال

لذا ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:

- تناوله قبل ساعتين من تناول الطعام أوبعده بساعتين
- قلل من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل: الموز،التمر،الطماطم، البطاطس، وعصير البرتقال

المرجع متوفر عند الطلب



إن هذا الدواء يتفاعل مع:

- كل الأطعمة

- يسبب ارتفاع في مستوى البوتاسيوم في الدم اذا تم تناوله مع الاطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل: الموز،التمر،الطماطم، البطاطس، وعصير البرتقال

لذا ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:

- تناوله قبل ساعتين من تناول الطعام أوبعده بساعتين
- قلل من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل: الموز،التمر،الطماطم، البطاطس، وعصير البرتقال

المرجع متوفر عند الطلب



إن هذا الدواء يتفاعل مع:

- كل الأطعمة

- يسبب ارتفاع في مستوى البوتاسيوم في الدم اذا تم تناوله مع الاطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل: الموز،التمر،الطماطم، البطاطس، وعصير البرتقال

لذا ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:

- تناوله قبل ساعتين من تناول الطعام أوبعده بساعتين
- قلل من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل: الموز،التمر،الطماطم، البطاطس، وعصير البرتقال

المرجع متوفر عند الطلب