

ISONIAZID



This medication interacts with:

- All food
- Tyramine-containing foods like banana, yeast breads, processed meats including sausage, salami and luncheon meat, beef and chicken cubes
- All aged cheeses such as blue, cheddar, mozzarella, parmesan and Swiss cheese)
- Beverages like beer

It is advisable if you are using this medication to:

- Take it one hour before or two hours after a meal.
- Avoid tyramine-containing foods
- Reduce excessive use of cheese.
- Monitor flushing, chills and blood pressure

Prepared & Approved by: Patient & Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

References :available upon request

07.01.2007

ISONIAZID



This medication interacts with:

- All food
- Tyramine-containing foods like banana, yeast breads, processed meats including sausage, salami and luncheon meat, beef and chicken cubes
- All aged cheeses such as blue, cheddar, mozzarella, parmesan and Swiss cheese)
- Beverages like beer

It is advisable if you are using this medication to:

- Take it one hour before or two hours after a meal.
- Avoid tyramine-containing foods
- Reduce excessive use of cheese.
- Monitor flushing, chills and blood pressure

Prepared & Approved by: Patient & Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

References :available upon request

07.01.2007

ISONIAZID



This medication interacts with:

- All food
- Tyramine-containing foods like banana, yeast breads, processed meats including sausage, salami and luncheon meat, beef and chicken cubes
- All aged cheeses such as blue, cheddar, mozzarella, parmesan and Swiss cheese)
- Beverages like beer

It is advisable if you are using this medication to:

- Take it one hour before or two hours after a meal.
- Avoid tyramine-containing foods
- Reduce excessive use of cheese.
- Monitor flushing, chills and blood pressure

Prepared & Approved by: Patient & Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

References :available upon request

07.01.2007

ISONIAZID



This medication interacts with:

- All food
- Tyramine-containing foods like banana, yeast breads, processed meats including sausage, salami and luncheon meat, beef and chicken cubes
- All aged cheeses such as blue, cheddar, mozzarella, parmesan and Swiss cheese)
- Beverages like beer

It is advisable if you are using this medication to:

- Take it one hour before or two hours after a meal.
- Avoid tyramine-containing foods
- Reduce excessive use of cheese.
- Monitor flushing, chills and blood pressure

Prepared & Approved by: Patient & Family Education Committee/ Al Rahba Hospital

References :available upon request

07.01.2007



أيزونيايد

ان هذا الدواء يتفاعل مع الاغذية التالية:

- كل الأطعمة
 - أي غذاء يحتوي على " الثيرامين " مثل:
الموز، خبز الخميرة، اللحم المعالج(المصنع): مثل النقانق، السلامي، اللانشون والمرتديلا البقري أو الدجاج
 - الجبن المعالج أو (القديم) مثل: الجبن (الأزرق): لونه مائل للزرقة، جبن البارميسان، الجبنه السويسرية و جبن الموزاريلا
 - المشروبات: مثل البيرة (الغير كحوليه)
- ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:**
- خذهُ قبل الطعام بساعة أو بعد الطعام بساعتين
 - تجنب الطعام الذي يحتوي على الثيرامين-
 - قلل لمن تناول الاجبان بكثرة
 - راقب احمرار الوجه، الرعشة وضغط الدم

المرجع متوفر عند الطلب



أيزونيايد

ان هذا الدواء يتفاعل مع الاغذية التالية:

- كل الأطعمة
 - أي غذاء يحتوي على " الثيرامين " مثل:
الموز، خبز الخميرة، اللحم المعالج(المصنع): مثل النقانق، السلامي، اللانشون والمرتديلا البقري أو الدجاج
 - الجبن المعالج أو (القديم) مثل: الجبن (الأزرق): لونه مائل للزرقة، جبن البارميسان، الجبنه السويسرية و جبن الموزاريلا
 - المشروبات: مثل البيرة
- ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:**
- خذهُ قبل الطعام بساعة أو بعد الطعام بساعتين
 - تجنب الطعام الذي يحتوي على الثيرامين-
 - قلل لمن تناول الاجبان بكثرة
 - راقب احمرار الوجه، الرعشة وضغط الدم

المرجع متوفر عند الطلب



أيزونيايد

ان هذا الدواء يتفاعل مع الاغذية التالية:

- كل الأطعمة
 - أي غذاء يحتوي على " الثيرامين " مثل:
الموز، خبز الخميرة، اللحم المعالج(المصنع): مثل النقانق، السلامي، اللانشون والمرتديلا البقري أو الدجاج
 - الجبن المعالج أو (القديم) مثل: الجبن (الأزرق): لونه مائل للزرقة، جبن البارميسان، الجبنه السويسرية و جبن الموزاريلا
 - المشروبات: مثل البيرة
- ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:**
- خذهُ قبل الطعام بساعة أو بعد الطعام بساعتين
 - تجنب الطعام الذي يحتوي على الثيرامين-
 - قلل لمن تناول الاجبان بكثرة
 - راقب احمرار الوجه، الرعشة وضغط الدم

المرجع متوفر عند الطلب



أيزونيايد

ان هذا الدواء يتفاعل مع الاغذية التالية:

- كل الأطعمة
 - أي غذاء يحتوي على " الثيرامين " مثل:
الموز، خبز الخميرة، اللحم المعالج(المصنع): مثل النقانق، السلامي، اللانشون والمرتديلا البقري أو الدجاج
 - الجبن المعالج أو (القديم) مثل: الجبن (الأزرق): لونه مائل للزرقة، جبن البارميسان، الجبنه السويسرية و جبن الموزاريلا
 - المشروبات: مثل البيرة
- ينصح عند استخدام هذا الدواء بالتالي:**
- خذهُ قبل الطعام بساعة أو بعد الطعام بساعتين
 - تجنب الطعام الذي يحتوي على الثيرامين-
 - قلل لمن تناول الاجبان بكثرة
 - راقب احمرار الوجه، الرعشة وضغط الدم

المرجع متوفر عند الطلب